

Barbabetola

DA ZUCCHERO

Appunti
di tecnica colturale



PRINCIPALI FITOFAGI ATTIVI NELLE PRIME FASI CULTURALI

Nelle prime fasi colturali numerosi sono i parassiti in grado di provocare danni a carico delle plantule in emergenza e negli stadi immediatamente successivi. Nei nostri comprensori i più temibili risultano gli adulti di altica e di atomaria mentre, relativamente allo stadio larvale, danni significativi sono ascrivibili ad elateride e nottua terricola. L'altica è un insetto che provoca piccole e

numerose rosure a livello fogliare. Atomaria, elateride e nottue terricole provocano danni a livello radicale e del colletto. Questi parassiti sono spesso responsabili di riduzioni dei livelli di investimento e rallentamenti dello sviluppo colturale. Occasionalmente si riscontrano, inoltre, danni imputabili a pentodon punctatus, scutigerella, collemboli, blanuilidi, grillotalpa.



elateride



altica



atomaria



nottua terricola

L'impiego degli geoinsetticidi in confettatura assicura un efficace controllo di altica ed atomaria ed una buona copertura in relazione ad una contenuta presenza degli altri parassiti.

PER OGNI INFORMAZIONE CONTATTARE IL PERSONALE ANB
Altre informazioni tecniche sono disponibili sul sito www.anbinforma.it

Redatto da Giovanni Bellettato