



# Barbabetola

## DA ZUCCHERO

### PRINCIPALI INFESTANTI COMUNI

Per infestanti comuni si intendono le malerbe riscontrate più frequentemente nei bietolai. In linea generale, le medesime possono essere adeguatamente condizionate dalle

applicazioni di pre emergenza e soprattutto nelle prime fasi colturali, efficacemente controllate con i consueti programmi di diserbo di post emergenza.



AVICULARE



PERSICARIA



CHENOPODIO



FALLOPIA



RAFANO



SENAPE



ER. MORELLA



AMARANTO



VERONICA



STELLARIA



MERCORELLA



ANAGALLIDE



# Barbabietola DA ZUCCHERO

## PRINCIPALI INFESTANTI SPECIFICHE

Le infestanti specifiche sono malerbe riscontrate in particolari contesti colturali o localizzate su porzioni dell'appezzamento. Il controllo di queste infestanti prevede l'utilizzo di prodotti specifici, che non

rientrano nei programmi standard di intervento. Tali formulati vengono usati in abbinamento ai consueti programmi di diserbo di post emergenza o impiegati da soli in interventi mirati.



AMMI MAJUS



ABUTHILON



CUSCUTA



ARTEMISIA



STOPPIONE



XANTHIUM



STRAMONIO



GIARONE (Graminacee)



CAMOMILLA

La distinzione fra "infestanti comuni" ed "infestanti specifiche" successivamente formulata ha una connotazione di carattere puramente teorico, legata più ad esigenze di schematizzazione che a differenze oggettive. In molti contesti colturali si assiste, infatti, ad una diffusione su larga scala di malerbe definite "ruderali" e di infestanti che alcuni

anni fa risultavano circoscritte a particolari areali (abuthilon, ammi majus, altre). Per quanto riguarda invece le infestanti comuni, alcune malerbe largamente diffuse, quali aviculare, solanum, amaranto, risultano inefficacemente controllate con i consueti programmi di intervento e richiedono l'associazione di specifici principi attivi.