



## IL DISERBO DI POST EMERGENZA PER GRANO TENERO, DURO, ORZO

Il controllo delle infestanti dei cereali autunno vernini viene effettuato, nella maggior parte dei casi, con un unico intervento in post emergenza. L'arco

temporale è molto ampio: dall'inizio della fase di accestimento alla fase di botticella. Si riportano alcune delle possibili soluzioni, raggruppate in base alla flora presente.

### INFESTAZIONE MISTA DI DICOTILEDONI, CON ESCLUSIONE DI VERONICA E GALIUM

<i>prodotto</i>	<i>dose</i>	<i>indicazioni</i>
<b>GRANSTAR ULTRA SX</b>	50 g/ha	Epoca: III foglia- botticella
<b>GAIO SX/PIKE</b>	15 g/ha	Epoca: III foglia- botticella
<b>GRANSTAR POWER SX</b>	1,09 Kg/ha	Epoca: inizio accestimento-levata, più attivo su veronica
<b>LOGRAN</b>	37 g/ha	Epoca: IV foglia-accestimento

### INFESTAZIONE MISTA DI DICOTILEDONI, INCLUSO GALIUM, CON ESCLUSIONE DI VERONICA

<i>prodotto</i>	<i>dose</i>	<i>indicazioni</i>
<b>KICKER</b>	1,5 l/ha	Epoca: inizio accestimento-inizio levata, buona attività perenni
<b>ARIANE II</b>	3,5 l/ha	Epoca: inizio accestimento-fine levata,
<b>MANTA GOLD</b>	2,5 l/ha	Epoca: inizio accestimento-levata,

### INFESTAZIONE MISTA DI DICOTILEDONI, INCLUSI GALIUM E VERONICA

<i>prodotto</i>	<i>dose</i>	<i>indicazioni</i>
<b>MEXTROL PLUS</b>	1,5 l/ha	Epoca: accestimento-levata,

### INFESTAZIONE MISTA MONO E DICOTILEDONI, INCLUSI GALIUM E VERONICA

<i>prodotto</i>	<i>dose</i>	<i>indicazioni</i>
<b>PUMA GOLD</b>	1,25 l/ha	Epoca: inizio accest.-inizio levata. Aggiungere Biopower 1 l/ha
<b>HUSSAR MAXX</b>	0,3 kg/ha	Epoca: inizio accest.-inizio levata. Aggiungere Biopower 1 l/ha
<b>FLORAMIX</b>	0,265 kg/ha	Epoca: inizio accest.-Il nodo. Add. olio colza/bagn. non ionico

### PRODOTTI INDICATI IN PRESENZA DI INFESTANTI GRAMINACEE

<i>prodotto</i>	<i>dose</i>	<i>indicazioni</i>
<b>PROPER ENERGY</b>	0,75 l/ha	Epoca: acc.-inizio lev, miscib. dicotil. eccetto dicamba/ormonici
<b>STARPROP</b>	0,8 l/ha	Epoca: acc.-inizio lev, miscib. dicotil. eccetto dicamba/ormonici
<b>TOPIK 80 EC/VIP 80</b>	0,75 l/ha	Epoca: acc.-inizio lev, miscib. dicotil. eccetto dicamba/ormonici
<b>CELIO</b>	0,25 l/ha	Epoca: acc.-inizio lev, miscib. dicotil. eccetto dicamba/ormonici

## PRODOTTI INDICATI IN PRESENZA DI GALIUM

<b>LEGION</b>	30 g/ha	Epoca: III foglia-accestimento, attivo anche su crucifere
---------------	---------	---

## DISERBANTI ORMONICI DA IMPIEGARE IN EPOCA RITARDATA (contro crucifere, cirsium, convulvolo, equiseto, papavero)

<b>AGHERUD DICAMBA</b>	2,5 l/ha	Epoca: inizio accest.-levata – anche fallopia, fumaria, aviculare.
<b>MONDAK 21 S</b>	0,4 l/ha	Epoca: inizio accestimento-levata
<b>ERBITOX LV4</b>	0,4 l/ha	Epoca: inizio levata-botticella
<b>U46 D CLASS</b>	2,5 l/ha	Epoca: inizio levata-botticella
<b>ERBITOX E 30</b>	3 l/ha	Epoca: inizio levata-botticella
<b>U46 COMBI-FLUID</b>	0,75 l/ha	Epoca: inizio levata-botticella

Per esigenze di sintesi le soluzioni riportate non rappresentano la totalità delle possibili scelte. La selezione si basa su caratteristiche di fruibilità, praticità e flessibilità di impiego, unite a peculiarità di efficacia e selettività. Per una consultazione integrale dei

programmi di contenimento delle infestanti dei cereali autunno vernini si invita a consultare le pubblicazioni nella stampa specializzata (Informatore Agrario 3/2011, altri).



*Si raccomanda di rispettare le disposizioni vigenti in materia e quanto previsto dalle direttive o da eventuali specifici protocolli, anche in relazione alla possibile revisione o deroga di alcuni prodotti. Per l'impiego dei fitofarmaci, attenersi scrupolosamente alle modalità ed alle avvertenze riportate in etichetta. In ogni caso la scelta dei prodotti, delle epoche e dei dosaggi dovrà essere compatibile con le condizioni della coltura.*

*Redatto da Giovanni Bellettato*