

# Coltivare Energia

## Pratiche Agronomiche, filo diretto

Pennuti Dr. Giancarlo  
Responsabile ANB Romagna – Italia Centrale



### Attenzione punteruolo dello stelo e meligete

In alcuni campi di colza sono già presenti i bottoni fiorali. Con le temperature in aumento, anche gli altri raggiungeranno presto questa fase. Occorre quindi tenere sotto controllo la coltura per rilevare la presenza o meno di adulti di meligete. In alcuni distretti produttivi del Centro Italia, sono stati già segnalati i primi adulti unitamente ad attacchi di punteruolo dello stelo. Su accertata presenza dei fitofagi, intervenire a pieno campo prima dell'apertura fiori.

### Monitoraggio

Ispezionate il campo e guardate attentamente i fiori alla ricerca del meligete (sul sito Anb, in alcuni miei articoli, trovate foto dell'insetto). In alternativa, per le operazioni di monitoraggio durante il periodo critico della coltura (dalla ripresa vegetativa primaverile a tutta la fioritura) si utilizzano **bacinelle trappola di colore giallo** (il colore giallo attrae la maggior parte degli insetti nocivi) riempitela con 1 litro di acqua e un po' di sapone liquido (del tipo per piatti). E' bene posizionarle sulla fascia perimetrale della coltivazione su un adeguato supporto (vanno bene le "cannucce di plastica" per impianti elettrici in modo da sollevarle progressivamente seguendo la crescita delle piante) mantenendole sempre un poco al disopra dell'altezza della vegetazione. **Una finezza è il posizionamento sul lato da cui giungono i venti dominanti.** Controllare la "trappola" regolarmente, per individuare l'arrivo degli insetti e il loro incremento numerico. Sostituire l'acqua ogni 5-6 giorni. La bacinella va posta all'altezza della vegetazione (in questa fase 40-50 cm da terra). Se durante il periodo di suscettibilità delle piante sono catturati **+ di 10 adulti per vaschetta nelle 24 ore o 40-50 esemplari nell'arco di una settimana**: si è raggiunta la soglia che giustifica un intervento chimico mirato (attenzione però a non arrivare troppo tardi e comunque consideriamo che per avere la massima efficacia, deve essere eseguito alla comparsa del fitofago e non tardivamente in piena fase di attacco). **Il problema sorge nel trovare prodotti sistemici registrati.** Nella scala della dannosità per la coltura è comunque sempre **il meligete al primo posto** e il punteruolo ha una posizione normalmente intermedia.

*Foto esplicative sul posizionamento delle bacinelle a diversi stadi di sviluppo colturale*



Pennuti Dr. Giancarlo  
[g.pennuti@anb.it](mailto:g.pennuti@anb.it)