



# // MAIS

## IL DISERBO DI POST EMERGENZA DEL MAIS

### CONTROLLO DI INFESTAZIONI DI GRAMINACEE

| <i>prodotto</i> | <i>dose</i> | <i>indicazioni</i>   |
|-----------------|-------------|--|
| <b>GHIBLI</b>   | 1-1,5 l/ha  | mais entro 6/8 f., gramin. entro accestimento, temp. 10-25°C |
| <b>TITUS</b>    | 40-50 g/ha  | mais 2-8 f., graminacee entro accest., temperatura 13- 25°C  |
| <b>EQUIP</b>    | 2-2,7 l/ha  | mais 2-6 foglie  |

### CONTROLLO DI INFESTAZIONI DI DICOTILEDONI

| <i>prodotto</i>     | <i>dose</i>   | <i>indicazioni</i>   |
|---------------------|---------------|--|
| <b>MONDAK 21 S</b>  | 0,75/1,2 l/ha | mais entro 5 foglie a dose piena                                   |
| <b>CALLISTO</b>     | 0,5/1 l/ha    | mais 2-8 foglie., infestanti 2-4 foglie                            |
| <b>MIKADO</b>       | 1/1,5 l/ha    | mais 2-8 foglie  |
| <b>PEAK</b>         | 20-25 g/ha    | mais 3-6 foglie, infestanti primi stadi sviluppo                   |
| <b>CASPER</b>       | 0,3-0,4 g/ha  | mais 3-8 foglie, inf. annuali primi stadi, perenni da altez. 15 cm |
| <b>STARANE GOLD</b> | 1-1,2 l/ha    | mais 2-7 foglie  |

### CONTROLLO DI INFESTAZIONI MISTE DI GRAMINACEE E DICOTILEDONI ANNUALI

| <i>prodotto</i>          | <i>dose</i>   | <i>indicazioni</i>   |
|--------------------------|---------------|--|
| <b>GHIBLI + CALLISTO</b> | 1 + 0,75 l/ha | mais entro 6/8 f., gramin. entro accestimento, temp. 10-25°C |

### CONTROLLO DI INFESTAZIONI MISTE DI GRAMINACEE E DICOTILEDONI ANNUALI E PERENNI

| <i>prodotto</i>                 | <i>dose</i>    | <i>indicazioni</i>   |
|---------------------------------|----------------|--|
| <b>GHIBLI+CALLISTO+MONDAK21</b> | 1+0,6+0,6 l/ha | mais entro 6/8 f., gramin. entro accestimento, temp. 10-25°C   |
| <b>PEAK + MONDAK 70 WG</b>      | 20+220 g/ha    | mais entro 5 foglie; addiz. Callisto 0,5 l/ha presenza solanum |

### SPETTRO D'AZIONE DEI PRINCIPALI ERBICIDI DI POST EMERGENZA DEL MAIS

| <i>prodotto</i>         | <i>graminacee</i> |                | <i>dicotiledoni</i> |                   |                  |                 |                |
|-------------------------|-------------------|----------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------|
|                         | <i>annuali</i>    | <i>perenni</i> | <i>comuni</i>       | <i>chenopodio</i> | <i>abuthilon</i> | <i>equiseto</i> | <i>perenni</i> |
| <b>GHIBLI</b>           | buona             | buona          | media               | nulla             | nulla            | nulla           | nulla          |
| <b>TITUS MAIS ULTRA</b> | buona             | buona          | media               | nulla             | nulla            | nulla           | nulla          |
| <b>EQUIP</b>            | buona             | buona          | media               | media             | media            | nulla           | nulla          |
| <b>MONDAK 21 S</b>      | nulla             | nulla          | buona               | buona             | media            | media           | buona          |
| <b>CALLISTO</b>         | scarsa            | nulla          | buona               | buona             | media            | nulla           | nulla          |
| <b>MIKADO</b>           | media             | nulla          | buona               | buona             | buona            | nulla           | nulla          |
| <b>PEAK</b>             | nulla             | nulla          | buona               | buona             | buona            | nulla           | nulla          |
| <b>CASPER</b>           | nulla             | nulla          | media               | buona             | buona            | media           | buona          |
| <b>STARANE GOLD</b>     | nulla             | nulla          | media               | scarsa            | buona            | media           | buona          |

- *Le soluzioni indicate rappresentano una sintesi delle possibili applicazioni.*
- *I dosaggi riportati sono indicativi e dovranno essere opportunamente modulati in considerazione dello stadio e delle condizioni della coltura.*
- *Si precisa che alcuni diserbanti richiedono l'associazione con uno specifico attivatore/bagnante. L'associazione di formulati complementari e compatibili contribuisce ad ampliare lo spettro d'azione del trattamento. Attenersi alle indicazioni in etichetta.*
- *Rispettare le disposizioni vigenti in materia e quanto previsto dalle direttive o da eventuali specifici protocolli, anche in relazione alla possibile revisione o deroga di alcuni prodotti.*

*Redatto da Giovanni Bellettato*