

TECNICHE DI CONTENIMENTO DEI FITOFAGI- IL CLEONO



IMPORTANZA - L'elevata incidenza dei danni riscontrati in alcune delle scorse annate suggerisce particolare attenzione a questo fitofago. Gli adulti provocano erosioni fogliari nella fase primaverile, ma il danno economico è ascrivibile alla fase larvale. Le larve provocano gallerie nel fittone, interferendo sui processi di accrescimento della radice, che risulta suscettibile a rotture. Il prodotto risulta deprezzato ed esposto a marciumi.

MONITORAGGIO - Il medesimo prevede osservazioni visive delle caratteristiche erosioni fogliari a forma di "mezza luna", ascrivibili alla presenza degli adulti ed il conteggio delle catture nei "vasetti trappola" (foto a destra). A partire dalla fine del mese di marzo, i vasetti debbono essere posizionati sul bordo della coltura, nella direttrice di spostamento del coleottero, coincidente con il confine del bietolaio dell'annata precedente.



TECNICHE DI CONTENIMENTO - AZIENDE CON ATTACCHI MODERATI - Eseguire un unico trattamento sui bordi del campo, nella fase di spostamento degli adulti (soglia pari a n. 1-2 adulti/settimana per vasetto), in modo da creare uno sbarramento sulla direttrice di attacco dell'insetto.

AZIENDE CON FORTI ATTACCHI - Dopo 15 giorni dall'esecuzione del primo trattamento, effettuato con le modalità precedentemente descritte, trattare a pieno campo.

PRINCIPALI INSETTICIDI FOGLIARI PER IL CONTROLLO DEL CLEONO

Prodotto	Principio Attivo	%	Classe Tossicol .	Dose litri o Kg/Ha	Intervallo sicurezza	Miscibilita erbicida	Difesa Integrata Mis. 214 PSR 07-13 ANNATA 2010
CONTEST	Alfamestrina	14,5	Xi	0,3	24	SI	SI
HUNTER	Ciflutrin	5	Xn	0,5	3	SI	SI
NURELLE 10	Cipermetrina	10	Xi	0,5	21	SI	SI
NURELLE D	Clorpirifos etile+Cipermetrina	45,4 + 4,54	Xn	0,8	60	NO	NO
DECIS JET	Deltametrina	1,63	Xi	0,8	3	SI	SI
DURBAN	Clorpirifos	44,53	Xn N	1,0	60	NO	NO
KLARTAN 20 EW	Fluvalinate	21,4	Xi	0,3	7	SI	SI
KARATE ZEON	Lambda-cialotrina	9,4	Xn N	0,2	7	SI	SI

*Distribuendo l'insetticida in associazione a diserbanti, impiegare unicamente piretroidi. Per tutte le operazioni colturali, si raccomanda di **rispettare le disposizioni vigenti in materia e quanto previsto dalle direttive o da eventuali specifici protocolli**, anche in relazione alla possibile revisione o deroga di alcuni prodotti.*

Redatto da Giovanni Bellettato