








# La SOIA

## IL DISERBO DI POST EMERGENZA DELLA SOIA









L'intervento di post emergenza costituisce uno strumento di basilare importanza per il controllo delle infestanti e per il completamento del programma di diserbo della soia.

### PRINCIPALI APPLICAZIONI DI POST EMERGENZA DELLA SOIA











#### BASAGRAN SG 0,5-1,1 kg/ha + OLIO 1-2 kg/ha

INDICAZIONI:	impiegato nei trattamenti precoci, in epoca più tardiva utilizzare le dosi più elevate.							
CONTROLLA:								
	chenopod.	amaranto	camomilla	crucifere	abuthilon	bidens	solanum	
CONTIENE:	convolvulus, calystegia.							
NON CONTIENE:	graminacee.							
NOTE:	può essere miscelato: BASAGRAN SG 1 l/ha + TUAREG 1 l/ha + HARMONY 5 gr/ha.							

#### TUAREG 0,7-1,2 l/ha

INDICAZIONI:	trattare con soia fase prima trilobata.							
CONTROLLA:								
	abuthilon	amaranto	solanum	stramonio	crucifere	persicaria	portulaca	xanthium
CONTIENE:	convolvulus, calystegia, graminacee estive ai primi stadi di sviluppo.							
NON CONTIENE:	chenopodio, matricaria, papavero, picris.							

#### TUAREG 0,7-1,2 l/ha + HARMONY 3-7 gr/ha

INDICAZIONI:	dosare i due prodotti in base alle infestanti, alla tipologia del trattamento (unico o frazionato), allo stadio di sviluppo, alla temperatura (entro 25 °C); trattare con soia in fase da bilobata e seconda trilobata.							
CONTROLLA:								
	chenopod.	abuthilon	amaranto	stramonio	fallopia	persicaria	portulaca	cucifere
								
	solanum	xanthium						
CONTIENE:	bidens, papavero, convolvulus, calystegia, graminacee estive primi stadi.							
NON CONTIENE:	matricaria, picris.							

*In presenza di infestanti graminacee aggiungere Agil (1 l/ha) o (Stratos (1 l/ha) o Stratos ultra (2 l/ha); in alternativa effettuare interventi specifici impiegando i vari graminicidi ammessi.*

*Rispettare le indicazioni in etichetta, le disposizioni vigenti in materia e quanto previsto dalle direttive o da eventuali specifici protocolli, anche in relazione alla possibile revisione o deroga di alcuni prodotti. I dosaggi sono indicativi e dovranno essere opportunamente modulati in considerazione delle specificità aziendali.*