



La SOIA



























IL DISERBO PREVENTIVO DELLA SOIA

VANTAGGI DELLE APPLICAZIONI DI PRE EMERGENZA NEL DISERBO DELLA SOIA

- Eliminazione della competizione sin dalle prime fasi colturali;
- Migliore controllo delle infestanti difficili (chenopodio, abuthilon, bidens, stramonio, altre);
- Maggiore flessibilità nelle successive applicazioni di post emergenza;
- Riduzione dei fenomeni di fitotossicità, rispetto alle sole applicazioni di post emergenza;
- Riduzione dei rischi di fenomeni di resistenza e selezione flora di sostituzione.

Per contro, l'intervento preventivo risulta spesso non risolutivo e frequentemente necessita di un successivo intervento in post emergenza, finalizzato a completare il controllo delle malerbe.

PRINCIPALI APPLICAZIONI DI PRE EMERGENZA DELLA SOIA

Prodotti – dosaggi in l-kg/ha	Principali infestanti controllate					
STOMP AQUA 1-1,5 (MOST MICRO 1,5-2) + AFALON DS/LINURON SIPCAM FL 0,5-0,7						
	chenopod.	solanum	poligon.	portulaca	crucifere	composite
STOMP AQUA 1-1,5 (MOST MICRO 1,5-2) + DUAL GOLD 1-1,25						
	chenopod.	solanum	poligon.	portulaca	graminacee	
RONSTAR FL 1-1,5 + DUAL GOLD 1-1,25						
	solanum	composite	chenopod.	altre dicot.	graminacee	
MOST MICRO 1,5-2 (AFALON DS 0,5-0,7) + SUCCESSOR 600/RONIN 600 1,5-2						
	solanum	chenopod.	poligon.	portulaca	graminacee	
CADOU POMODORO SOIA 0,8-1 confezione						
	graminacee	amaranto	chenopod.	composite	crucifere	



Per tutte le miscele, l'aggiunta di **COMMAND 36 CS 0,25-0,30** amplia lo spettro d'azione nei confronti di abuthilon, solanum, portulaca.

In presenza di infestanti emerse, impiegare prodotti a base di glifosate nella fase di pre semina.

Rispettare le indicazioni in etichetta, le disposizioni vigenti in materia e quanto previsto dalle direttive o da eventuali specifici protocolli, anche in relazione alla possibile revisione o deroga di alcuni prodotti. I dosaggi sono indicativi e dovranno essere opportunamente modulati in considerazione delle specificità aziendali.