



IL DISERBO DI POST EMERGENZA PER GRANO TENERO, DURO, ORZO

L'intervento unico in post emergenza rappresenta la soluzione maggiormente diffusa per il controllo delle infestanti nei cereali autunno vernini. L'arco temporale di intervento è molto ampio essendo compreso fra l'inizio della fase di accestimento e la fase di botticella.

Si riportano alcune delle possibili soluzioni, raggruppate in base alla flora infestante presente.

INFESTAZIONE MISTA DI DICOTILEDONI, CON ESCLUSIONE DI VERONICA E GALIUM

<i>prodotto</i>	<i>dose</i>	<i>indicazioni</i>
GRANSTAR ULTRA SX MAROX DF/ NIMBLE	50 g/ha	Epoca: III foglia- botticella
TRATON SX	35 g/ha	Epoca: III foglia- botticella
GAIO SX/PIKE 20 WG	15 g/ha	Epoca: III foglia- botticella
GRANSTAR POWER SX	1,09 Kg/ha	Epoca: inizio accestimento-levata, più attivo su veronica
LOGRAN	37 g/ha	Epoca: IV foglia-accestimento

INFESTAZIONE MISTA DI DICOTILEDONI, INCLUSO GALIUM, CON ESCLUSIONE DI VERONICA

<i>prodotto</i>	<i>dose</i>	<i>indicazioni</i>
KICKER	1,5 l/ha	Epoca: inizio accestimento-inizio levata, buona attività perenni
ARIANE II	3,5 l/ha	Epoca: fine accestimento-fine levata, parziale su papavero
MANTA GOLD	2,5 l/ha	Epoca: fine accestimento-levata, parziale su papavero
ZENITH	0,75 l/ha	Epoca: fine accestimento-II nodo

INFESTAZIONE MISTA DI DICOTILEDONI, INCLUSI GALIUM E VERONICA

<i>prodotto</i>	<i>dose</i>	<i>indicazioni</i>
MEXTROL PLUS/BLESAL EXTRA	1,5 l/ha	Epoca: accestimento-levata

INFESTAZIONE MISTA MONO E DICOTILEDONI, INCLUSI GALIUM E VERONICA

<i>prodotto</i>	<i>dose</i>	<i>indicazioni</i>
PUMA GOLD EC	1,25 l/ha	Epoca: inizio accest.-inizio levata. Aggiungere Biopower 1 l/ha
HUSSAR MAXX	0,3 kg/ha	Epoca: inizio accest.-inizio levata. Aggiungere Biopower 1 l/ha
FLORAMIX	0,265 kg/ha	Epoca: inizio accest.-II nodo. Add. olio colza/bagn. non ionico
CALIBAN TOP	0,4 kg/ha	Epoca: III foglia-fine accest. Add. bagnante Wetting plus 1 l/ha
TRAXOS ONE	0,7 kg/ha	Epoca: III foglia-inizio levata. Non attivo su veronica

DISERBANTI PREVALENTEMENTE GRAMINICIDI ATTIVI SU ALCUNE DICOTILEDONI

ATLANTIS	0,4 kg/ha	Epoca: inizio acc-in.lev. Add.Biopower 1 l/ha - anche alcune dic.
RAVENAS EXTRA	1 l/ha	Epoca: III foglia-fine accestimento. Add. Bagnante non ionico

DISERBANTI INDICATI IN PRESENZA DI INFESTANTI GRAMINACEE

<i>prodotto</i>	<i>dose</i>	<i>indicazioni</i>
STARPROP	0,8 l/ha	Epoca: acc.-inizio lev, miscib. dicotil. eccetto dicamba/ormonici
TOPIK 80 EC/VIP 80/TRACE	0,75 l/ha	Epoca: acc.-inizio lev, miscib. dicotil. eccetto dicamba/ormonici
CELIO	0,25 l/ha	Epoca: acc.-inizio lev, miscib. dicotil. eccetto dicamba/ormonici
AXIAL PRONTO	0,8 l/ha	Epoca: III foglia-fine levata. Più attivo su Lolium e Phalaris
TRAXOS PRONTO	1 l/ha	Epoca: III foglia-fine levata. Più attivo su Aloperus ed avena

DISERBANTI INDICATI IN PRESENZA DI GALIUM

AZIMUT	0,1 l/ha	Epoca: inizio accestimento-inizio levata, anche a basse temp.
TOMAHAWK/TOMAGAN	1 l/ha	Epoca: inizio accestim.-botticella anche su fallopia e convolvulo
STARANE GOLD	1,2 l/ha	Epoca: inizio accestimento-inizio levata, spettro limitato

DISERBANTI ORMONICI DA IMPIEGARE IN EPOCA RITARDATA (contro crucifere, cirsium, convolvolo, equiseti, papavero)

BUCTRIL UNIVERSAL	1 l/ha	Epoca: inizio accestimento-levata
MONDAK 21 S	0,4 l/ha	Epoca: inizio accestimento-levata
ERBITOX LV4	0,4 l/ha	Epoca: inizio levata-botticella
PIMIENTO	0,6 l/ha	Epoca: inizio levata-botticella
ERBITOX E30/REGLAN SL	3 l/ha	Epoca: inizio levata-botticella
U46 COMBI-FLUID	0,75 l/ha	Epoca: inizio levata-botticella

Per esigenze di sintesi le soluzioni riportate non rappresentano la totalità delle possibili scelte. La selezione si basa su caratteristiche di fruibilità, praticità e flessibilità di impiego, unite a peculiarità di efficacia e selettività. Per una consultazione integrale dei programmi di contenimento delle infestanti dei cereali autunno vernini si invita a consultare le pubblicazioni nella stampa specializzata (Informatore Agrario 2/2012, altre).



Si raccomanda di rispettare le disposizioni vigenti in materia e quanto previsto dalle direttive o da eventuali specifici protocolli, anche in relazione alla possibile revisione o deroga di alcuni prodotti. Per l'impiego dei fitofarmaci, attenersi scrupolosamente alle modalità ed alle avvertenze riportate in etichetta. In ogni caso la scelta dei prodotti, delle epoche e dei dosaggi dovrà essere compatibile con le condizioni della coltura.

A cura di Giovanni Bellettato - Responsabile divulgazione tecnica Associazione Nazionale Bieticoltori.