



IL CORRETTO IMPIEGO DEI DISERBANTI GRAMINICIDI

Attenzione ai tempi di carenza


Nella corrente annata, il generale ritardo della chiusura dell'interfila ha favorito lo sviluppo delle infestanti graminacee. In particolare si rilevano giavone e sorghetta, ma sono frequenti anche infestazioni di setaria e digitaria. L'efficace controllo delle infestanti graminacee comporta la necessità di effettuare trattamenti specifici, impiegando le dosi più elevate riportate in etichetta, nel rispetto delle corrette norme operative. La tabella sottostante riassume i principali graminicidi e le indicazioni in relazione all'impiego sulle infestanti più diffuse.

Considerato il ritardo dei tempi di esecuzione dei trattamenti diserbanti graminicidi, tuttora in corso, si invita a verificare i tempi di carenza (intervallo di sicurezza) dei singoli formulati, al fine di rispettare la normativa vigente.



Principali graminicidi di post emergenza, dosaggi, tempi di carenza

Infestanti	giavone	sorghetta	Indicazioni etichetta su eventuali additivi	Tempi di carenza	
				bietola	soia
prodotti	Dose consigliata (l/ha in 250-300 l/ha di acqua)				
Agil (Shogun)	1	1,2	-	60	60
Fusilade Max	1,5	2	-	60	90
Leopard 5 EC	1,5	2	-	60	60
Targa Flo (Nervure S.)	1,5	2	-	60	60
Stratos	1,25	2	Aggiung. olio bianco	100	100
Stratos Ultra	2,5	4	-	100	100
Aramo 50	1,5	2	-	56	49
Select	0,6	0,6*	Aggiung. bagnante	60	60

 Efficacia buona

* rappresenta la dose massima in etichetta; su sorghetta da rizoma viene consigliato un doppio intervento, il primo con *Sorghum halepense* alto 20-30 cm ed il secondo dopo circa 15 giorni.





Suggerimenti operativi

- ✓ Dopo l'impiego della barra irroratrice per la distribuzione di prodotti su altre colture, curare la perfetta pulizia della stessa in ogni sua parte (botte, filtro, filtro, ugelli), utilizzando prodotti specifici o ammoniaca.
- ✓ Effettuare i trattamenti diserbanti di post-emergenza in assenza di vento e di rugiada, preferendo normalmente le ore serali o privilegiando il mattino in condizioni di siccità.
- ✓ Scegliere prodotti, eventuali additivi e dosaggi in funzione della specie e dello stadio dell'infestante.
- ✓ Trattare su infestanti graninacee in pieno turgore vegetativo e con elevata umidità dell'aria.
- ✓ Nell'imminenza di una pioggia, considerare valido il trattamento di post-emergenza quando sono trascorse almeno 6 ore dall'intervento.
- ✓ Nel miscelare insetticidi con prodotti diserbanti, utilizzare esclusivamente piretroidi.

A cura di Giovanni Bellettato - Responsabile divulgazione tecnica ANB.

Si raccomanda di rispettare le disposizioni vigenti in materia e quanto previsto dalle direttive o da eventuali specifici protocolli.

Per l'impiego dei fitofarmaci, attenersi scrupolosamente alle indicazioni ed alle avvertenze riportate in etichetta, in particolare in riferimento al rispetto dei dosaggi, delle modalità e dei tempi di carenza.

In considerazione dei numerosi provvedimenti di sospensione, revisione, revoca, si raccomanda di verificare preventivamente la conformità d'impiego dei singoli formulati.

In ogni caso la scelta dei prodotti, delle epoche e dei dosaggi dovrà essere compatibile con le condizioni della coltura.