



## La COLZA

annata 2013

Progetti divulgativi di



### IL CONTROLLO DELLE RINASCITE DELLA COLZA SULLE COLTURE IN SUCCESIONE

Dopo la raccolta della colza, per le specie in successione, le rinasce della crucifera costituiscono parte della flora infestante da contrastare.

#### Le perdite di prodotto e le rinasce della colza

L'entità delle rinasce può essere particolarmente rilevante in presenza di perdite di prodotto nella fase precedente o concomitante con la raccolta. Ciò può avvenire a seguito di grandinate (foto a destra) o a causa di condizioni operative che abbiano causato significative perdite di acheni nella fase di raccolta.

#### Il contenimento delle rinasce

Dal punto di vista rotazionale, la colza occupa lo stesso posto dei cereali autunno-vernini e può precedere numerose colture. Le rinasce di colza possono essere efficacemente contenute attraverso l'adozione di corrette tecniche agronomiche e mediante l'impiego di principi attivi efficaci nei confronti delle crucifere.

#### Indicazioni agronomiche

In assenza di un secondo raccolto, si consiglia di non lavorare il terreno ed attendere l'emergenza delle rinasce, che risultano particolarmente copiose dopo le prime piogge. Nella fase successiva, prima delle lavorazioni per la preparazione della coltura in successione, impiegare un prodotto a base di **glifosate**, utilizzando un dosaggio idoneo ad azzerare tutta la flora infestante presente.

#### Controllo delle rinasce su soia di secondo raccolto

I prodotti impiegati nei programmi di post emergenza della soia a base di Bentazone (Basagran SG), di Imazamox (Tuareg) e di trifensuron-metile (Harmony) hanno una buona efficacia nei confronti delle crucifere. Per il contenimento delle rinasce di colza risulta particolarmente attivo il prodotto **Harmony 3-7 gr/ha** da associare, eventualmente, a **Tuareg 0,7-1 l/ha** in presenza di altre dicotiledoni, in particolare abuthilon.



Copiose emergenze di colza successive ad una grandinata



### Controllo delle rinascite sui cereali autunno vernini

Nella fase di pre emergenza risulta efficace l'associazione di Pendimetalin (**Mostmicro 1,7-2,5 l/ha**) + Linuron (**Linuron Sipcam Flow 0,5 l/ha**); quest'ultimo prodotto risulta, infatti, particolarmente attivo nei confronti delle crucifere. In post emergenza, possono essere impiegati i seguenti prodotti: **Nuance – Granstar Power SX – Gaio SX – Atlantis WG - Kicker – Logran.**

*Si raccomanda di rispettare le disposizioni vigenti in materia e quanto previsto dalle direttive o da eventuali specifici protocolli.*

*Per l'impiego dei fitofarmaci, attenersi scrupolosamente alle indicazioni ed alle avvertenze riportate in etichetta, in particolare in riferimento al rispetto dei dosaggi, delle modalità e dei tempi di carenza.*

*In considerazione dei numerosi provvedimenti di sospensione, revisione, revoca, si raccomanda di verificare preventivamente la conformità d'impiego dei singoli formulati.*

*In ogni caso la scelta dei prodotti, delle epoche e dei dosaggi dovrà essere compatibile con le condizioni della coltura.*

*A cura di Giovanni Bellettato - Responsabile divulgazione tecnica ANB.*