Inform@
Informazione settimanale a cura degli uffici di ANB

La BARBABIETOLA DA ZUCCHERO
annata 2014
Progetti divulgativi di ANB

IL DISERBO NON SELETTIVO DI PRE SEMINA E DI PRE EMERGENZA

La pratica del diserbo totale, effettuata nella fase di pre semina o nel periodo immediatamente successivo a tale operazione è finalizzata a eliminare l'eventuale presenza di infestanti emerse sul letto di semina, mediante l'impiego di erbicidi non selettivi a base di *glifosate*. Tale operazione permette di semplificare i successivi interventi di post emergenza, migliorando l'efficacia complessiva del controllo delle malerbe e contenendo i costi colturali.

Programmi di diserbo non selettivo di pre semina e di pre emergenza

Il dosaggio d'impiego deve essere modulato in base alla tipologia delle infestanti presenti e in base allo stadio di sviluppo delle medesime. Alcuni formulati sono autorizzati per l'impiego anche nella fase di pre emergenza della coltura, generalmente entro 72 ore dall'operazione di semina.

Alcuni formulati a base di glifosate autorizzati anche in fase pre emergenza *

Dosi espresse in litri-Kg/ha

prodotto	principio attivo %	formulazione	dosi in base tipologia/stadio malerbe		
			Graminacee e dicotiledoni fino a 4 foglie	Dicotiledoni oltre 4 foglie (crucifere, fallopia, altre)	Infestanti difficili: Cirsium, Rumex, altre
BUGGY	30,4	flowable	2 - 3	3 - 4	4 - 6
FANDANGO 360 SL	30,7	liq. sol.	2 - 3	3 - 4	4 - 6
GLIFOSAR	30,4	liquido	2 - 3	3 - 4	4 - 6
HOPPER BLU	30,8	liq. sol.	2 - 3	3 - 4	4 - 6
PREMIUM TOP	31	sol. conc.	2 - 3	3 - 4	4 - 6
ROUNDUP BIOFLOW	28,79	conc. sol.	2 - 3	3 - 4	4 - 6
ROUNDUP 360 POWER	29,79	liq. sol.	2 - 3	3 - 4	4 - 6
VEBIGLYF	30,5	liq. sol.	2 - 3	3 - 4	4 - 6
ROUNDUP 450 PLUS	37,7	liq. sol.	1,6 - 2,4	2,4 - 3,2	3,2 - 4,9
ROUNDUP PLATINUM	35,74	liq. sol.	1,6 - 2,4	2,4 - 3,2	3,2 - 4,9
ROUNDUP MAX	68	granuli i.	1 - 1,5	1,5 - 2	1,8 - 2,6

Infestanti emerse rilevate frequentemente sui letti di semina

veronica

crucifere

stellaria

segue

Salvo diversa indicazione in etichetta, i prodotti riportati possono esse usati anche entro 72 ore dalla semina.
Si precisa che, per taluni formulati, viene consigliata l'aggiunta di 5 kg/ha di solfato ammonico (esempio Actinet, altri). Tale integrazione può risultare di maggiore utilità in presenza di basse temperature e bassi dosaggi di impiego.

Indicazioni tecniche

- ✓ *Impiegando prodotti devitalizzanti non selettivi utilizzare bassi volumi d'acqua (200 l/ha circa) o quantitativi comunque adeguati al dosaggio del prodotto distribuito.*
- ✓ *Utilizzare attrezzature che garantiscano una buona uniformità di distribuzione.*
- ✓ *Assicurare tutte le condizioni che escludano effetti di deriva del prodotto non selettivo sulle colture limitrofe.*
- ✓ *La distribuzione di prodotti non selettivi nella fase di pre emergenza dovrà essere conforme alle indicazioni riportate in etichetta. Per la salvaguardia della coltura, il trattamento dovrà, comunque, essere effettuato prima dello stadio di rottura del confetto ed in assoluta assenza di plantule di barbabietola emerse.*
- ✓ *Effettuando applicazioni di prodotti non selettivi, registrati nella fase di pre emergenza della coltura, possono essere associati diserbanti ad azione residuale.*

Per tutti i trattamenti, si raccomanda di rispettare le disposizioni vigenti e quanto previsto dalle direttive o da eventuali specifici protocolli, anche in relazione alla possibile revisione o deroga di alcuni prodotti.
Per l'impiego dei fitofarmaci, attenersi scrupolosamente alle modalità ed alle avvertenze riportate in etichetta.

A cura di Giovanni Bellettato - Responsabile divulgazione tecnica Associazione Nazionale Bieticoltori.

stoppione

romice

graminacee