Inform@
Informazione settimanale a cura degli uffici di ANB

La BARBABIETOLA DA ZUCCHERO
annata 2015
Progetti divulgativi di ANB

IL DISERBO NON SELETTIVO DI PRE SEMINA E DI PRE EMERGENZA

La pratica del diserbo totale è finalizzata a eliminare l'eventuale presenza di infestanti emerse sul letto di semina, mediante l'impiego di erbicidi non selettivi a base di glifosate. Tale applicazione viene effettuata nella fase di pre semina o nel periodo immediatamente successivo a tale operazione. Tale intervento consente di semplificare i programmi di contenimento delle infestanti, migliorandone l'efficacia e contenendo i costi colturali.

Programmi di diserbo non selettivo di pre semina e di pre emergenza

Il dosaggio d'impiego deve essere modulato in base alla tipologia delle infestanti presenti e in base allo stadio di sviluppo delle medesime. Alcuni formulati sono autorizzati per l'impiego anche nella fase di pre emergenza della coltura, generalmente entro 72 ore dall'operazione di semina.

Alcuni formulati a base di glifosate autorizzati anche in fase pre emergenza ***

Dosi espresse in litri-Kg/ha

prodotto	principio attivo %	formulazione	dosi in base tipologia/stadio malerbe		
			Graminacee e dicotiledoni fino a 4 foglie	Dicotiledoni oltre 4 foglie (crucifere, fallopia, altre)	Infestanti difficili: Cirsium, Rumex, altre
BUGGY	30,4	flowable	2 - 3	3 - 4	4 - 6
FANDANGO 360 SL	30,7	liq. sol.	2 - 3	3 - 4	4 - 6
GLIFOSAR	30,4	liquido	2 - 3	3 - 4	4 - 6
HOPPER BLU	30,8	liq. sol.	2 - 3	3 - 4	4 - 6
PREMIUM TOP	31	sol. conc.	2 - 3	3 - 4	4 - 6
ROUNDUP BIOFLOW	28,79	conc. sol.	2 - 3	3 - 4	4 - 6
ROUNDUP 360 POWER	29,79	liq. sol.	2 - 3	3 - 4	4 - 6
ROUNDUP 450 PLUS	37,7	liq. sol.	1,6 - 2,4	2,4 - 3,2	3,2 - 4,9
ROUNDUP PLATINUM	35,74	liq. sol.	1,6 - 2,4	2,4 - 3,2	3,2 - 4,9
ROUNDUP MAX	68	granuli i.	1 - 1,5	1,5 - 2	1,8 - 2,6
VEBIGLYF	30,5	liq. sol.	2 - 3	3 - 4	4 - 6

*** Salvo diversa indicazione in etichetta, i prodotti riportati possono esse usati anche entro 72 ore dalla semina.*

Infestanti emerse rilevate frequentemente sui letti di semina

Fra le numerose infestati emerse sul letto di semina, si rilevano più frequentemente le infestati di seguito elencate:

veronica

stellaria

crucifere

segue

Si precisa che, per taluni formulati, viene consigliata l'aggiunta di 5 kg/ha di solfato ammonico (esempio Actinet, altri), finalizzata a migliorare l'efficacia erbicida, in particolare in condizioni di basse temperature e con ridotti dosaggi di impiego. A questo riguardo si consiglia di seguire le indicazioni in etichetta.

Indicazioni tecniche

- ✓ *Impiegando prodotti devitalizzanti non selettivi utilizzare bassi volumi d'acqua (200 l/ha circa) o quantitativi comunque adeguati al dosaggio del prodotto distribuito.*
- ✓ *Utilizzare attrezzature che garantiscano una buona uniformità di distribuzione.*
- ✓ *Assicurare tutte le condizioni che escludano effetti di deriva del prodotto non selettivo sulle colture adiacenti.*
- ✓ *La distribuzione di prodotti non selettivi nella fase di pre emergenza dovrà essere conforme alle indicazioni riportate in etichetta. Per la salvaguardia della coltura, il trattamento dovrà, comunque, essere effettuato prima dello stadio di rottura del confetto e in assoluta assenza di plantule di barbabietola emerse.*
- ✓ *Effettuando applicazioni di prodotti non selettivi, registrati nella fase di pre emergenza della coltura, possono essere associati diserbanti ad azione residuale.*

Per tutti i trattamenti, si raccomanda di rispettare le disposizioni vigenti e quanto previsto dalle direttive o da eventuali specifici protocolli, anche in relazione alla possibile sospensione, revisione o revoca di alcuni prodotti.
Per l'impiego dei fitofarmaci, attenersi scrupolosamente alle modalità e alle avvertenze riportate in etichetta.

A cura di Giovanni Bellettato - Responsabile divulgazione tecnica Associazione Nazionale Bieticoltori.

stoppione

romice

graminacee