



Indicazioni operative

- ✓ Impiegando prodotti devitalizzanti non selettivi utilizzare bassi volumi d'acqua (200 l/ha circa) o quantitativi comunque adeguati al dosaggio del prodotto distribuito.
- ✓ Utilizzare attrezzature che garantiscano una buona uniformità di distribuzione.
- ✓ Assicurare tutte le condizioni che escludano effetti di deriva del prodotto sulle colture adiacenti.
- ✓ La distribuzione di prodotti non selettivi nella fase di pre emergenza dovrà essere conforme alle indicazioni riportate in etichetta. Per la salvaguardia della coltura, il trattamento dovrà, comunque, essere effettuato prima dello stadio di rottura del confetto e in assoluta assenza di plantule emerse.
- ✓ Effettuando applicazioni di prodotti non selettivi, registrati nella fase di pre emergenza della coltura, possono essere associati diserbanti ad azione residuale.
- ✓ Per tutti i trattamenti, si raccomanda di rispettare le disposizioni vigenti in materia e quanto previsto dalle direttive o da eventuali specifici protocolli di produzione.
- ✓ Verificare l'idoneità d'impiego dei prodotti fitosanitari anche in relazione a eventuali provvedimenti di sospensione, revisione o revoca.
- ✓ Nell'impiego dei prodotti fitosanitari attenersi scrupolosamente alle modalità alle restrizioni e alle avvertenze riportate in etichetta.

IL DISERBO NON SELETTIVO DI PRE SEMINA E DI PRE EMERGENZA

Le applicazioni con prodotti a base di "glifosate" in pre semina e in pre emergenza precoce, per i formulati autorizzati, semplificano i programmi di contenimento delle malerbe, migliorandone l'efficacia, contenendo i costi colturali e riducendo l'impiego complessivo di sostanze diserbanti.

Diserbanti non selettivi a base di glifosate

Le disposizioni UE della scorsa annata hanno autorizzato l'impiego dei diserbanti a base di "glifosate" per il 2018 e per i 4 anni successivi. Il dosaggio d'impiego di questi prodotti deve essere modulato in base alla tipologia delle infestanti presenti e in considerazione dello stadio di sviluppo delle medesime. Alcuni formulati sono autorizzati anche per l'impiego nella fase di pre emergenza della coltura, generalmente entro 72 ore dall'operazione di semina. A riguardo verificare le indicazioni in etichetta.

Alcuni formulati a base di glifosate - dosi espresse in litri-kg/ha

prodotto	principio attivo %	formulazione	dosi in base tipologia/stadio malerbe		
			Graminacee e dicotiledoni fino a 4 foglie	Dicotiledoni oltre 4 foglie (crucifere, fallopia, altre)	Infestanti difficili: Cirsium, Rumex, altre
BUGGY TF *	30,8	liq. sol.	1,5 - 3	3 - 4,5	4,5 - 6
BUGGY G	31,2	conc. sol.	1,5 - 3	3 - 4,5	4,5 - 6
ROUNDUP PLATINUM *	35,74	liq. sol.	1 - 2,5	2,5 - 3,5	3,5 - 5
ROUNDUP POWER 2	28,8	liq. sol.	1,5 - 3	3 - 4,5	4,5 - 6
GLYFOS DAKAR	68	granuli s.	0,8 - 1,5	1,5 - 2,5	2,5 - 3
TAIFUN MK CL	30,8	sol. conc.	1,5 - 3	3 - 4,5	4,5 - 6

* formulazioni autorizzate anche nella fase di pre emergenza, entro 72 ore dalla semina - verificare indicazioni in etichetta.

Per alcuni formulati a base di "glifosate" si consiglia l'aggiunta di solfato ammonico (1-1,5% del volume d'acqua - circa 5 kg/ha) per migliorare l'efficacia erbicida, in particolare in condizioni di: basse temperature, dosaggi ridotti di sostanza attiva, infestanti molto sviluppate o scarsamente recettive, acque ricche di sostanza organica, volumi d'acqua elevati e in tutti i casi in cui sia necessario velocizzare l'azione devitalizzante. I formulati a base di glifosate di recente introduzione non richiedono, in genere, l'aggiunta di solfato ammonico. Seguire le indicazioni in etichetta del diserbante e dell'additivo.