Inform@
Informazione mensile a cura degli uffici ANB

Numero uno – 24 gennaio 2020



In questo numero

- ✓ ***Bietola:*** *scelta varietale annata 2020 - pagg. 1/2*
- ✓ ***Bietola:*** *punti di distribuzione seme 2020 soci ANB - box pag. 1*
- ✓ ***Bietola:*** *varietà consigliate 2020 sperimentazione Beta/Co.Pro.B. - p. 3/4*
- ✓ ***Colza:*** *concimazione azotata - pag. 5*
- ✓ ***Mercati:*** *flash sui mercati cerealicoli e sulla soia - pagg. 6/7*
- ✓ ***Mercati:*** *report USDA 10 gennaio 2020 - box pag. 6*
- ✓ ***Mercati:*** *quotazioni nazionali Bologna principali prodotti - box pag. 7*
- ✓ ***ANB Coop:*** *proposte contrattuali 2020 - pag. 8*
- ✓ ***ANB Coop:*** *contatti - box pag. 8*

SCELTA DELLA CULTIVAR PER LE SEMINE DI BARBABIETOLA 2020

La corretta scelta varietale si basa sulla preliminare valutazione delle caratteristiche e delle potenzialità aziendali, al fine di ottenere il migliore risultato riferito allo specifico contesto produttivo. Sulla base di questa premessa, l'analisi delle caratteristiche del plafond genetico disponibile consentirà di individuare i materiali in grado di garantire il raggiungimento degli obiettivi prefissati. Nell'ambito dell'articolata gamma varietale, dalla scorsa annata sono disponibili anche cultivar tolleranti lo specifico erbicida "Conviso One",, che consentono di ottimizzare e semplificare la tecnica di diserbo.

Criteri di scelta varietale in riferimento alla presenza del nematode

La valutazione dello stato sanitario del suolo, in relazione alla presenza del nematode cisticolo "*Heterodera schachtii*", rappresenta il criterio di scelta varietale preliminare. A riguardo, l'esecuzione di una specifica analisi del terreno potrà fornire preziose informazioni. In presenza di forti infestazioni, cioè con più di 400 uova/larve per 100 grammi di suolo, si suggerisce di sospendere temporaneamente la coltivazione della barbabietola negli appezzamenti interessati. In presenza di livelli di infestazione contenuti, cioè compresi entro 400 uova/larve per 100 grammi di suolo, la scelta varietale dovrà essere orientata esclusivamente verso cultivar "nematolleranti". L'utilizzo delle medesime è prudenzialmente consigliato anche qua-

PUNTI DI DISTRIBUZIONE

SEME BIETOLA 2020

Il seme bietola è disponibile presso i consueti recapiti ANB. Al fine di assicurare la disponibilità della cultivar richiesta e per concordare la modalità di consegna, si consiglia di contattare il tecnico ANB di riferimento.

Quistello (MN)
Loc. Zambone - Quistello MN
Per prenotazioni e consegna a domicilio contattare:
Giovanni Bellettato 335 71 00 184

Commessaggio (MN)
Strada Tessagli, 11 - Commessaggio MN
Per prenotazioni contattare:
Claudio Becchi tel. 335 824 28 87

Torrile (PR)
Per prenotazioni e consegna a domicilio contattare:
Vittorio Artoni tel. 337 59 88 89

ANB Rovigo, ANB Ferrara, ANB Piove Di Sacco
Per i Soci ANB delle province di Rovigo, Padova e Ferrara, il seme può essere prenotato tramite delega e ritirato presso i recapiti ANB, senza supplementi di costo, contattando:
Iole Byloos tel. 335 72 30954
Giovanni Bellettato tel. 335 71 00 184

Tortona (AL)
Contattare:
Maurizio Lanati tel. 324 58 10 596

Inform@
Informazione settimanale a cura degli uffici di ANB



lora non sia stato possibile effettuare le specifiche analisi, ma non si possa escludere la presenza del parassita. Le nuove cultivar "nematolleranti" garantiscono livelli produttivi equiparabili a quelli delle varietà "non nematolleranti". La maggior parte delle cultivar "nematorreranti", tuttavia, sono caratterizzate da scarsi livelli di tolleranza alla cercospora, condizione che suggerisce particolare attenzione nei programmi di protezione fogliare, in particolare per gli estirpi tardivi. L'assenza di infestazioni da "*Heterodera schachtii*" consente l'utilizzo anche delle cultivar "non nematolleranti".

Criteri di scelta della cultivar in riferimento alle caratteristiche del suolo e all'epoca di raccolta programmata

Le cultivar con indici di peso radici elevato, definite "a peso", sono da preferire nei contesti notoriamente caratterizzati dalla scarsa propensione alle performance quantitative, soprattutto in presenza di terreni "forti", cioè contraddistinti da una marcata presenza della componente argillosa. Le cultivar "a peso" sono, inoltre, da preferire qualora sia programmata una raccolta nella prima fase di conferimento. Saranno da privilegiare, invece, le cultivar con indice polarimetrico elevato, definite "a titolo", quando sia nota la propensione alla produzione di radici e di basse polarizzazioni, in particolare quando i terreni sono tendenzialmente "sciolti" e contraddistinti da una cospicua presenza della frazione sabbiosa. Tali varietà sono da preferire, inoltre, quando sia programmata una raccolta tardiva. Per le colture da raccogliere nella parte finale della campagna risulta prudenziale scegliere varietà caratterizzate da un buon livello di tolleranza alla cercospora. Ciò in quanto, se opportunamente protette e sostenute sotto l'aspetto nutrizionale, saranno in grado di contrastare con maggiore efficacia la virulenza della malattia. Le maggiori perdite produttive, indicate con il termine "retrogradazione", imputabili a rivegetazione a seguito di malattie fungine e di senescenza dell'apparato fogliare, si registrano, infatti, nella parte finale della campagna di raccolta.

Criteri di scelta della cultivar in riferimento alla presenza della malattia fungina "Rhizoctonia solani"

Qualora nel terreno destinato alla coltivazione siano stati precedentemente osservati marciumi ascrivibili al fungo "*Rhizoctonia solani*", la scelta varietale dovrà essere orientata verso specifiche cultivar tolleranti (tab. 4).

Cultivar adatte a semine precoci

Qualora si effettuino semine anticipate, eseguite entro la prima decade di febbraio, dovranno essere utilizzate cultivar idonee, tolleranti la pre fioritura. A riguardo sono in essere iniziative per la fornitura di seme assicurato contro i danni da gelo. Per informazioni contattare i tecnici ANB.

Cultivar "Sistema Conviso Smart"

Dal 2019 sono disponibili le varietà tolleranti lo specifico erbicida. Tale soluzione semplifica e ottimizza la tecnica di diserbo della bietola, escludendo fenomeni di fitotossicità.

Tabelle delle cultivar consigliate da BETA/Co.Pro.B per le scelte varietali 2020

Nelle pagine successive si riportano le tabelle con le cultivar consigliate da Beta/Co.Pro.B. per le semine 2020. Le medesime sono tratte dall'articolo apparso su L'Informatore Agrario n. 46/2019.

Le caratteristiche delle varietà in termini di produttività, tolleranze, attitudine al peso e al titolo sono annualmente indicate in tabelle, che riportano i materiali consigliati da Beta, *evidenziati in rosso*. Le liste si suddividono in base alla sottoindicata classificazione.

Serie nematodi - Riporta le migliori varietà nematolleranti, testate nel biennio 2018/2019 in terreni infestati dal parassita (tabella 1). Tali cultivar possono essere presenti anche nelle liste "base" e "catalogo", qualora produttivamente superiori alla media dei relativi standard.

Serie base - Contempla le migliori varietà in prova nel triennio 2017-2019 (tabella 2) in terreno sano.

Serie catalogo - Riporta le migliori varietà in prova nel biennio 2018/2019 (tabella 3). Trattasi di nuove cultivar, talora non ancora compiutamente testate. Le prove per la redazione di tale lista sono effettuate in terreni esenti dall'infestazione del nematode, pertanto, in assenza dello specifico requisito di tolleranza, tali cultivar debbono essere impiegate in terreno sano.

Varietà tolleranti la rizoctonia - Riporta le cultivar, in prova nel biennio 2018/2019, tolleranti la malattia fungina responsabile di marciumi radicali (tabella 4).

Varietà Conviso Smart – include le cultivar tolleranti lo specifico erbicida "Conviso One", in prova nel biennio 2018/2019 (tabella 5).

Inform@
Informazione settimanale a cura degli uffici di ANB

LE VARIETA' DI BARBABIETOLA DA ZUCCHERO PER LE SEMINE 2020

Estratto da L'INFORMATORE AGRARIO n. 46/2019 *di M. Zavanella, G. Campagna, A. Fabbri, A. Vacchi, D. Rosini - Co.Pro.B.-Beta*

TABELLA 1 - Varietà tolleranti il nematode consigliate per le semine 2020 provate in terreni infestati da *H. schachtii* (valore indice) (1)

Varietà (2)	Ditta sementiera	Resa radici	Polarizzazione	Saccarosio	Potassio	Sodio	Azoto α-amminico	Purezza sugo denso	Plv	Tolleranza cercospora
Eliska Kws	Kws	107,82	102,46	110,53	91,86	102,72	92,18	100,73	112,20	NT
Bali	Sesvanderhave	109,25	98,05	106,76	101,85	105,31	106,33	99,24	105,21	MS
Marinella Kws	Kws	103,20	101,07	104,16	105,99	96,51	89,31	100,43	104,76	NT
Beniamina Kws	Kws	116,83	93,85	109,21	84,74	155,54	75,63	98,85	104,62	M
BTS 555	Betaseed	101,94	100,40	102,40	99,92	89,29	91,34	100,74	102,76	NT
Bambou	Sesvanderhave	105,24	98,66	103,52	100,53	105,93	95,88	99,67	102,41	NT
BTS 5950N	Betaseed	107,06	97,79	103,85	84,25	113,32	107,83	99,54	101,97	MS
Balear	Sesvanderhave	104,07	99,04	102,76	101,87	108,00	98,63	99,56	101,90	S
Tonga	Sesvanderhave	104,31	98,15	102,22	102,03	113,65	96,55	99,38	100,98	NT
Portal	Sesvanderhave	110,43	94,97	104,49	90,07	133,05	94,26	98,85	100,92	MS
Lombok	Sesvanderhave	99,34	100,68	100,07	100,37	100,99	109,36	99,67	100,51	NT
Preziosa Kws	Kws	110,39	94,54	104,14	96,74	122,74	95,29	98,92	100,43	S
Cassini	Strube	96,57	99,04	95,71	95,70	102,36	101,63	99,88	95,17	NT
BTS 8645N	Betaseed	102,21	90,93	92,69	90,26	144,67	79,90	98,47	86,94	NT
C.V. (%)		2,94	1,96	3,66	2,19	4,06	4,29	0,33	4,45	
DMS 5%		6,69	4,11	8,11	4,47	10,34	8,72	0,69	9,71	
Media		106,15	97,67	103,36	95,31	118,87	94,86	99,43	101,68	

(1) Dati espressi in valori indice (100 = media delle varietà standard) e riferiti al biennio 2018-19. (2) Le varietà sono ordinate per plv decrescente. In rosso le varietà consigliate per le semine 2020 su terreni infestati. **Plv** = produzione lorda vendibile.
Tolleranza alla cercospora: M = media; **MS** = medio-scarsa; **S** = scarsa; **NT** = non tollerante.

TABELLA 2 - Varietà della serie base consigliate per le semine 2020 provate in terreni esenti dal nematode *H. schachtii* (valore indice) (1)

Varietà (2)	Ditta sementiera	Tolleranza nematode	Resa radici	Polarizzazione	Saccarosio	Potassio	Sodio	Azoto α-amminico	Purezza sugo denso	Plv	Tolleranza cercospora
Marinella Kws (std)	Kws	•	101,40	101,57	103,06	104,96	90,52	89,72	100,52	104,08	NT
BTS 555	Betaseed	•	101,87	101,02	102,92	100,55	88,46	95,54	100,53	103,57	NT
Balear	Sesvanderhave	•	104,68	99,30	103,76	104,66	106,46	99,91	99,51	103,03	S
Einstein	Strube		95,52	103,98	99,58	93,94	100,61	96,22	100,68	101,94	MS
Ninfea	Sesvanderhave		95,16	104,40	99,21	93,63	97,66	92,01	100,91	101,57	S
Mohican	Sesvanderhave		94,63	104,32	98,92	92,67	97,89	93,80	100,89	101,44	S
Serenada Kws	Kws		109,12	95,76	104,20	104,90	131,50	103,63	98,35	101,29	M
BTS 8840	Betaseed		107,93	96,12	103,70	91,86	131,88	78,12	99,71	101,11	S
Sebastiana Kws	Kws		105,94	97,14	102,75	93,81	110,46	85,58	100,10	100,84	S
Portal	Sesvanderhave	•	104,47	97,17	101,34	96,38	122,41	95,78	99,26	99,38	MS
Fenec	Sesvanderhave		106,44	95,77	101,91	99,92	114,06	88,59	99,52	99,16	S
Lombok (std)	Sesvanderhave	•	97,25	99,81	96,92	100,99	105,76	110,14	99,44	96,67	NT
Cassini (std)	Strube	•	96,53	100,14	96,51	95,63	103,18	104,03	99,95	96,44	NT
Presley	Strube	•	101,64	96,84	98,20	94,44	116,8	90,26	99,72	96,07	NT
C.V. (%)			2,56	1,05	2,60	1,98	4,90	3,25	0,23	2,79	
DMS 5%			4,37	1,75	4,41	3,25	8,92	5,16	0,39	4,71	
Media			101,61	99,52	100,93	97,74	108,4	94,52	99,93	100,47	

(1) Dati espressi in valori indice (100 = media delle varietà standard) e riferiti al triennio 2017-19. (2) Le varietà sono ordinate per plv decrescente. In rosso le varietà consigliate per le semine 2020 su terreni esenti dal nematode. **Plv** = produzione lorda vendibile. **Std** = standard.
Tolleranza alla cercospora: M = media; **MS** = medio-scarsa; **S** = scarsa; **NT** = non tollerante.

Inform@
Informazione settimanale a cura degli uffici di ANB

LE VARIETA' DI BARBABIETOLA DA ZUCCHERO PER LE SEMINE 2020

Estratto da L'INFORMATORE AGRARIO n. 46/2019 *di M. Zavanella, G. Campagna, A. Fabbri, A. Vacchi, D. Rosini - Co.Pro.B.-Beta*

TABELLA 3 - Varietà della serie Catalogo consigliate per le semine 2020 provate in terreni esenti dal nematode *H. schachtii*

Varietà (2)	Ditta sementiera	Tolleranza nematode	Resa Radici	Polariz-zazione	Sacca-rosio	Potassio	Sodio	Azoto α-amminico	Purezza sugo denso	Plv	Tolleranza cercospora
Eliska Kws	Kws	•	109,39	101,64	111,24	92,23	103,63	93,65	100,63	112,51	NT
Bambou	Sesvanderhave	•	110,31	98,28	108,47	100,12	105,84	100,10	99,61	107,35	NT
Beniamina Kws	Kws	•	117,53	94,49	110,87	90,88	141,46	76,61	99,22	106,81	MS
BTS 5950 N	Betaseed	•	110,06	97,98	107,55	87,68	106,33	103,56	99,96	106,02	MS
Tonga	Sesvanderhave	•	108,39	99,22	106,86	100,78	110,11	99,94	99,56	105,91	NT
Meradonna Kws	Kws		112,46	96,46	108,13	103,70	96,92	109,40	99,26	105,52	MS
Bali	Sesvanderhave	•	109,14	98,07	106,71	103,42	110,25	108,32	99,04	105,20	MS
Essenzia Kws	Kws		119,96	92,64	110,49	80,81	145,57	69,98	99,60	104,68	M
Gregoria Kws	Kws		114,18	95,08	108,26	87,33	135,85	79,04	99,65	104,64	M
Preziosa Kws	Kws	•	113,93	94,98	107,84	99,76	118,68	99,93	98,88	104,16	S
BTS 2730	Betaseed		116,07	93,08	107,54	84,58	141,65	80,41	99,19	102,33	MS
Tesla	Strube		94,26	104,32	98,49	111,84	97,79	95,34	100,21	101,14	M
BTS 8645N	Betaseed	•	110,51	92,11	101,70	89,79	145,31	84,15	98,60	96,24	NT
C.V. (%)			2,41	1,05	2,70	3,54	4,12	3,48	0,21	3,03	
DMS 5%			5,80	2,19	6,26	7,18	11,12	6,92	0,45	6,87	
Media			111,54	96,73	107,45	93,89	124,82	92,09	99,38	104,97	

(1) Dati espressi in valori indice (100 = media delle varietà standard) e riferiti al biennio 2018-19. (2) Le varietà sono ordinate per plv decrescente. In rosso le varietà consigliate per le semine 2020 su terreni esenti dal nematode. **Plv** = produzione lorda vendibile.
Tolleranza alla cercospora: M = media; **MS** = medio-scarsa; **S** = scarsa; **NT** = non tollerante.

TABELLA 4 - Varietà tolleranti la rizoctonia per le semine 2020 (valori indice) (1)

Varietà (2)	Ditta sementiera	Tolleranza nematode	Resa radici	Polariz-zazione	Sacca-rosio	Potassio	Sodio	Azoto α-amminico	Purezza sugo denso	Plv	Tolleranza cercospora
Melindia Kws	Kws		105,92	96,75	102,20	87,12	133,11	78,45	99,92	99,83	MS
Moliere	Strube		94,78	99,75	94,89	87,38	134,15	88,31	99,91	95,03	NT
Octopus	Sesvanderhave		102,39	93,28	95,30	96,69	154,52	94,18	97,79	90,91	MS

(1) Dati espressi in valori indice (100 = media delle varietà standard) e riferiti al biennio 2018-19. (2) Le varietà sono ordinate per plv decrescente. **Plv** = produzione lorda vendibile. **Tolleranza alla cercospora: M** = media; **MS** = medio-scarsa; **S** = scarsa; **NT** = non tollerante.

TABELLA 5 - Varietà Conviso Smart consigliate per le semine 2020 provate in terreni esenti dal nematode *H. schachtii* (valori indice) (1)

Varietà (2)	Ditta sementiera	Tolleranza nematode	Resa radici	Polariz-zazione	Sacca-rosio	Potassio	Sodio	Azoto α-amminico	Purezza sugo denso	Plv	Tolleranza cercospora
Smart Briga Kws	Kws	•	101,31	106,15	107,35	88,48	74,78	103,63	101,54	111,12	MS
Smart Renja Kws	Kws	•	108,64	99,76	108,37	91,29	109,33	109,11	99,70	108,13	NT
Smart Belamia Kws	Kws		107,12	95,30	101,89	89,79	146,55	84,57	99,02	98,40	M
Smart Gladiata Kws	Kws		103,58	89,79	93,66	93,45	130,25	93,52	98,26	87,22	NT

(1) Dati espressi in valori indice (100 = media delle varietà standard) e riferiti al biennio 2018-19. (2) Le varietà sono ordinate per plv decrescente. **Plv** = produzione lorda vendibile. In rosso le varietà consigliate per le semine 2020.
Tolleranza alla cercospora: M = media; **MS** = medio-scarsa; **S** = scarsa; **NT** = non tollerante.

Inform@
Informazione settimanale a cura degli uffici di ANB

CONCIMAZIONE AZOTATA

La congrua disponibilità azotata rappresenta uno degli aspetti determinanti la produttività della colza. Situazioni di carenza azotata nella fase primaverile si traducono, infatti, in forti contrazioni produttive.

La conoscenza delle caratteristiche chimico fisiche del suolo e sua la dotazione dei singoli elementi rappresenta la valutazione preliminare e un presupposto imprescindibile per impostare un razionale programma di concimazione per tutte le colture. L'esecuzione di un'analisi del terreno, ogni 4-5 anni, fornisce queste preziose informazioni. Nell'impostazione del piano di concimazione della colza dovranno, inoltre, essere considerati i seguenti aspetti: precessione colturale, stato della coltura, potenzialità produttive, caratteristiche varietali, tecniche di coltivazione, andamento climatico invernale ed entità delle precedenti precipitazioni.

Programma di concimazione della colza

Le esigenze azotate della colza sono modeste nel periodo autunnale, mentre, nella fase primaverile, la disponibilità dell'elemento rappresenta un aspetto determinante il risultato della coltura. In linea generale, nell'ipotesi di una media dotazione azotata, con buone prospettive produttive (3,5/4,5 tonnellate per ettaro), il programma di concimazione potrà fare riferimento allo schema successivamente riportato, che prevede la somministrazione di 120/140 unità di azoto, in uno o due apporti:

doppia somministrazione azotata

epoca	unità N_2	*concime*	dose q.li/ha
inizio febbraio	40/50	*solfato ammonico 20%* *	2,0/2,5
inizio marzo	80/90	*urea 46%* #	1,7/2,0

* tale somministrazione apporta anche 114/142 unità di ossido di zolfo;
# in alternativa a urea utilizzare nitrato ammonico - dose al 26% N2 - 3-3,5 q/ha.

unica somministrazione azotata

epoca	unità N_2	concime	dose q.li/ha
fine febbraio	120/140	urea 46%	2,6/3,0

Realizzato da Giovanni Bellettato Responsabile divulgazione tecnica ANB.
Associazione Nazionale Bieticoltori | e-mail: anb@anb.

Ottimizzare la concimazione azotata della colza

- ✓ *La congrua disponibilità azotata è un presupposto necessario per garantire il risultato produttivo.*
- ✓ *La somministrazione di 120/140 unità di azoto può essere considerata una base generale di riferimento per i terreni mediamente dotati.*
- ✓ *La quota azotata dovrà essere modulata considerando le specificità pedologiche aziendali, lo stato della coltura, l'andamento stagionale e le caratteristiche varietali.*
- ✓ *Il migliore soddisfacimento delle esigenze azotate della colza si ottiene effettuando due somministrazioni. La sperimentazione ANB ha, tuttavia, evidenziato che un unico apporto azotato, a fine febbraio, non comporta variazioni statisticamente significative sull'esito produttivo finale. Tale soluzione consente di semplificare le operazioni colturali e di ridurre i costi di produzione.*
- ✓ *L'apporto di solfato ammonico nella prima somministrazione azotata assicura una congrua disponibilità di zolfo alla coltura, caratterizzata da elevate asportazioni di questo elemento. Sperimentalmente (ANB), tuttavia, non sono emerse differenze produttive significative fra l'impiego dell'azoto in forma ureica o da solfato. Nell'impossibilità di effettuare la doppia somministrazione, nell'ottica del contenimento dei costi di produzione e della semplificazione delle pratiche colturali, può essere utile orientarsi sulle formulazioni azotate economicamente più convenienti.*
- ✓ *Si raccomanda di rispettare le normative vigenti, in particolare in riferimento alla direttiva nitrati e quanto previsto da eventuali specifici protocolli di produzione.*

Inform@
Informazione settimanale a cura degli uffici di ANB

FLASH SUI MERCATI CEREALICOLI E SULLA SOIA

A cura dell'ufficio commerciale ANB COOP - 24 gennaio 2020

Dopo la lunga pausa delle festività, i mercati dei cereali e delle proteoleaginose nazionali hanno ripreso il loro corso con lievi, ma importanti aumenti dei prezzi. Fa eccezione del frumento duro, che è rimasto stazionario. Tale trend trova conferma anche sui mercati internazionali, dove si registrano aumenti delle quotazioni delle principali commodities agricole, in particolare per il frumento tenero e in modo meno marcato anche per la soia. Il dollaro USA resta stabile nei confronti dell'euro a 1,11 dollaro/euro al cambio attuale. Gli ultimi dati di produzione a livello mondiale, riportati dall'USDA del 10 gennaio scorso, indicano una sostanziale riconferma dei valori di dicembre e di novembre 2019. Ciò nonostante la previsione di una riduzione delle produzioni, pressoché unanime di tutti gli analisti. Tale ipotesi era suffragata dalle minori rese di mais e di soia, ascrivibili alla piovosità registrata durante le semine e nella fase autunnale. Gli analisti esprimono, invece, maggiori preoccupazioni in merito ai problemi di siccità registrati in alcuni Stati del Brasile, per i possibili danni sulle produzioni di soia e di mais. I dati dell'ultimo report USDA fanno ben sperare per una ripresa dei prezzi. Tale miglioramento dovrebbe riguardare anche il frumento tenero, per la consistente diminuzione degli "ending stocks" USA e mondiali e per la riduzione delle semine di grani invernali negli USA. Anche per il **mais**, la diminuzione degli "ending stocks" potrebbe innescare attività di "short covering", con la conseguente possibile ripresa dei prezzi. Per quanto riguarda la **soia**, invece, nonostante i dati produttivi molto bassi del report USDA, i prezzi potrebbero rimanere stazionari. Ciò a causa delle relazioni commerciali USA/CINA e per i possibili aumenti di produzione in Brasile e Argentina, imputabili a rese superiori alle aspettative.

Frumento tenero

Nonostante l'abbondante produzione mondiale, i prezzi del frumento tenero a livello internazionale e nazionale sono ripresi ad aumentare. Gli aggiornamenti dei fondamentali USDA dello scorso 10 gennaio hanno sicuramente influito positivamente su questo corso, in quanto hanno ridimensionato di 1.4 mil. di Tn. gli stock mondiali per effetto della "minor supply" e del maggior consumo; in particolare sono diminuiti quelli degli USA, che sono calati del 10,65% rispetto allo scorso anno.

Analizzando le quotazioni di apertura del 2020 dell'Ager di Bologna, rispetto al medesimo periodo della precedente annata, le tipologie n. 2 e n. 3 hanno registrato, mediamente, una flessione di circa 33 euro per tonnellata, mentre il calo per il grano tenero di forza si è attestato in 17 euro per tonnellata.

Frumento duro

I Prezzi del grano duro sono in ripresa in Europa e ben tenuti in Canada, da una domanda più attiva verso i Paesi del mediterraneo. In particolare i

Principali dati del report USDA del 10 gennaio 2020

Mais - *produzione*

Mil. di Tn.	2019	2018
USA	**347,78**	364,26
Brasile	**101,00**	101, 00
Argentina	**50,00**	51,00
Mondo	**1.110,84**	1.122,49

Rispetto al precedente report di dicembre 2019, la produzione mondiale di mais è stata stimata in aumento di (+ 2,2 Mil. di Tn.). Ciò a causa dell'aumento della produzione in Russia e nella UE, mentre la produzione mondiale in raffronto a quella dello scorso anno è diminuita di 11,70 Mil. di Tn. Il report riporta anche un'importante diminuzione degli stocks in Cina e Brasile.

Soia - *produzione*

Mil. di Tn.	2019	2018
USA	**96,84**	120,52
Brasile	**123,00**	117,00
Argentina	**53,00**	55,30
Mondo	**337,70**	358,28

Rispetto al precedente report di dicembre 2019, la produzione di soia USA 2019/2020 è rimasta invariata, mentre la produzione mondiale è stimata in diminuzione di 20,60 Mil. di Tn. rispetto a quella del 2018/19.

Grano - *produzione*

Mil. di Tn.	2019	2018
USA	**52,26**	51,31
UE	**154,00**	136,86
Russia/Ucraina	**103,65**	97,00
Mondo	**764,39**	731,45

Rispetto al precedente report di dicembre 2019 la produzione mondiale di frumento è diminuita di 1,0 Mil. di Tn., a seguito delle recenti stime di una minor produzione in Russia, mentre la produzione mondiale è stata stimata a 764,39 milioni di Ton. (+ 33 Mil. di Tn. sul 2018 e + 1,52 Mil. di Tn. sul 2017).

prezzi sono ben tenuti in Francia e in Spagna, sostenuti dalla domanda interna e da una quasi ormai certa domanda dei Paesi del Nord Africa.
In Italia, la domanda è attualmente moderata e spesso orientata sulla merce da prezzo di bassa qualità. Tali quotazioni, tuttavia, non riescono a forzare ribassi ai prezzi della media e alta qualità. In Puglia il frumento nazionale è ben tenuto e l'offerta è scarsa, nonostante i frequenti arrivi di merce estera. Per cui si può affermare che, nonostante quotazioni stazionarie sulle nostre piazze, il frumento di buona qualità è in buona vista.
Da un confronto fra le quotazioni Ager di apertura del 2019 e del 2020, il prezzo del nostro grano duro registra, comunque, un significativo incremento, pari a 35/36 euro per tonnellata per il prodotto del nord e di 40/42 euro per tonnellata per il prodotto del centro.

Mais

Il primi tre listini dell'Ager di Bologna del 2020 hanno riportato un timido, ma costante, miglioramento della quotazione del mais pari, rispettivamente, a +2, +1, +2 €/Tn. La prima quotazione, tuttavia, si attesta su un valore inferiore di circa 10 euro per tonnellata rispetto al medesimo periodo della precedente annata.

Soia

Dopo un'annata 2019 con valori della soia decisamente sotto tono (vedi grafico), le prime tre quotazioni del 2020 della granaria di Bologna registrano un trend in costante aumento (+5, +3,5 e +3 €/Tn). La prima quotazione risulta migliorativa anche rispetto allo stesso periodo della precedente annata, con un incremento di 9 euro per tonnellata.

Andamento quotazioni settimanali (media minimo-massimo) soia mercato Ager Bologna - annate 2017/2020



Andamento dei mercati nazionali

Prezzi rilevati alla Borsa merci di Bologna il giorno 24 gennaio 2020

Valori min-max, espressi in euro per tonnellata - il dato riportato sulla colonna a destra indica la differenza rispetto alla quotazione della settimana precedente.

MERCE FRANCO PARTENZA

Frumento tenero nazionale

Prezzo stabile n. 1 e in lieve aumento n. 2-3

n° 1 Spec. Forza	**211-216**	inv.
n° 2 Speciale	**198-203**	+2 €/t
n° 3 Fino	**198-201**	+2 €/t

Frumento duro nazionale nord

Domanda scarsa e prezzi stazionari

Nord Fino	**255-260**	inv.
Nord Buono m.	**245-250**	inv.
Nord Mercantile	**228-233**	inv.

Soia

Domanda stazionaria e prezzo in aumento

Prod. Nazionale	**359-361**	+3

MERCE FRANCO ARRIVO

Frumento duro nazionale centro

Domanda scarsa e prezzi stazionari

Centro Fino	**269-274**	inv.
Centro Buono m.	**259-264**	inv.
Centro Mercant.	**244-249**	inv.

Mais

Domanda scarsa e prezzi in lieve aumento

Nazion. Zootecn. (c/tto 103)	**174-176**	+2 €/t
Nazion. Zootecn. (con caratteristiche)	**178-180**	+2 €/t

(merce resa in franco arrivo sulla piazza di Bologna)

Inform@
Informazione settimanale a cura degli uffici di ANB

PROPOSTE CONTRATTUALI ANB COOP 2020
COLZA, SOIA, GIRASOLE

Colza

ANB Coop propone contratti di coltivazione e vendita della colza particolarmente vantaggiose per gli agricoltori. Per la produzione 2020 sono previste opzioni di valorizzazione in base a "quotazioni giornaliere" e a "prezzo aperto". Quest'ultima modalità ha come riferimento la media delle quotazioni Matif future agosto del periodo compreso fra il 15 maggio e il 15 luglio. Nella fase di semina è stata, inoltre, formulata la possibilità di vendere parte della propria produzione a "prezzo fissato" di 370 euro per tonnellata netti, franco arrivo spremitore. La disponibilità di questa opzione era limitata al raggiungimento plafond.

Soia

La proposta contrattuale della corrente annata è particolarmente favorevole, facendo riferimento alla quotazione settimanale del mercato Ager di Bologna, con la possibilità di disporre la vendita "a prezzo noto" ogni giovedì, sino alla fine del mese di maggio 2020, senza spese di stoccaggio e di trasporto, con partenza da magazzino. Sono tuttora in corso le consegne della soia produzione 2019. A riguardo, informiamo quanti interessati che è ancora possibile sottoscrivere contratti relativi alla corrente annata e conferire la propria produzione.

Girasole

Le proposte contrattuali 2019 hanno trovato largo consenso da parte dei produttori, grazie a condizioni particolarmente favorevoli.

Contatti ANB COOP

Per la sottoscrizione dei contratti e per ogni informazione, contattare i tecnici di riferimento:

Iole Byloos
prov. PD/ VR/VE/RO/VI/TV
tel. 335 72 30 954

Giovanni Bellettato
prov. FE/MN/LO/MI
tel. 335 71 00 184

Davide Grandisoli
prov. CR/BS/MN
tel. 339 80 16 484

Maurizio Lombardi
prov. PC/PR
tel. 328 78 88 896

Stefano Cantori
prov. BO/MO
tel. 339 80 17 513

Rosina Fulgenzi *Coop A.I.B.*
Area Marche
tel. 336 42 55 80

Maurizio Lanati
area PV/Piemonte
tel. 324 58 10 596

Oppure contattare la sede ANB COOP

Matteo Ferri *- coordinatore*
tel. 335 79 62 087

Paola Gennari *- amministrazione*
tel. 051 60 33 445